

ESPASMOSEDAL

Q-0209-029



Solución inyectable

Analgésico, antiespasmódico, antipirético y desinflamatorio



Fórmula

Cada 100 ml contienen	
Dipirona sódica	25 g
Sulfato de magnesio	20 g
Alcohol bencílico	2 ml
Vehículo c.b.p.	100 ml

Uso en especies



Bovinos



Equinos



Ovinos



Caprinos



Caninos



Porcinos



Felinos

INDICACIONES

Analgésico, antiespasmódico, antipirético y desinflamatorio indicado en el control del dolor y tratamiento de: espasmos musculares, tratamiento de elección en cólico de equinos, estados febriles altos, espasmos de la musculatura lisa durante el parto; en pequeñas especies previene el vómito; en gastritis evita que las cerdas devoren a sus lechones.

FARMACOLOGÍA

• FARMACOCINÉTICA:

Después de su aplicación intramuscular es absorbida hacia el torrente circulatorio, alcanza niveles adecuados en el SNC y es metabolizado; sus metabolitos son excretados por vía renal y su efecto se establece entre 5 y 15 minutos después de su aplicación.

• FARMACODINAMIA:

La acción de la dipirona se basa en la inhibición de la ciclooxigenasa, la enzima que convierte al ácido araquidónico de los endoperóxidos cíclicos. Acción antiespasmódica de musculatura lisa, regula los centros vegetativos acompañado de la dilatación de vasos periféricos, mejorando la irrigación sanguínea de los músculos estriados. Es un derivado del pirazol. Tiene acción antipirética por vasodilatación cutánea y sudoración. Tiene débil acción analgésica sobre las estructuras viscerales y muy fuertes sobre las estructuras somáticas.

DOSIS: DIARIA

Animal	Dosis
Bovinos	10 ml por cada 100 kg de peso corporal
Equinos	14 ml por cada 100 kg de peso corporal
Ovinos y Caprinos	1 ml por cada 10 Kg de peso corporal
Porcinos	14 ml por cada 100 kg de peso corporal
Caninos	1 a 2 ml por cada 10 kg de peso corporal
Felinos	1 ml por cada 10 kg de peso corporal

ESPASMOSEDAL

Q-0209-029

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: INTRAMUSCULAR PROFUNDA O INTRAVENOSA LENTA



ADVERTENCIAS

No se administre en conjunto con medicamentos que produzcan hepatotoxicidad.
En altas dosis puede producir agranulocitosis y leucopenia.
No se administre en conjunto con clorpromazina porque puede provocar hipotermia severa.
No administrarse con fenilbutazona o agentes barbitúricos.
No se administre en animales sensibles a los ingredientes de la fórmula.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.
No se deje al alcance de los niños.
Para uso exclusivo del médico veterinario.
Su venta requiere receta médica cuantificada.

TIEMPO DE RETIRO

No usar el producto 3 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.
La leche de los animales tratados no deberá consumirse hasta 3 días después de su última aplicación.
No administrar a equinos destinados al consumo humano.

PRESENTACIONES

50 ml