

ESPASMOSEDAL

Q-0209-029



Solution injectable

Analgésique, antispasmodique, antipyrétique y anti-inflamatoire



Composition

Chaque 100 ml contient	
Dipyrone sodique	25 g
Sulfate de magnésium	20 g
Alcool benzylique	2 ml
Excipient	100 ml

Usage pour



Bovins



Chevaux



Moutons



Chèvres



Chiens



Porcs



Félins

INDICATIONS D'UTILISATION

Analgésique, antispasmodique, antipyrétique et anti-inflamatoire indiqué pour soulager la douleur et pour le traitement de: spasmes musculaires, traitement de choix pour le colique des chevaux, états fébriles, spasmes de la musculature lisse pendant l'accouchement. Chez les petits animaux, il prévient le vomissement ; pour les gastrites, il évite que les truies mangent leurs porcelets.

PHARMACOLOGY CLINIQUE

• PHARMACOCINÉTIQUE:

Après l'application intramusculaire, il est absorbé vers le torrent circula:toire et atteint le niveau adéquat dans le système nerveux central et est métabolisé et les métabolites sont excrétés par voie rénale. Son effet est établi entre 5 et 15 minutes après l'application.

• PHARMACODYNAMIQUE:

L'action de la dipyrone inhibe la cyclooxygénase, l'enzyme qui transforme l'acide arachidonique des endoperoxydes cycliques.

Tiene débil acción analgésica sobre las estructuras viscerales y muy fuertes sobre las estructuras somáticas.

POSOLOGIE:

Animal	Dosis
Bovins	10 ml par 100 kg du poids corporel
Chevaux	14 ml par 100 kg du poids corporel.
Ovins y caprins	1 ml par 10 kg du poids corporel
Porcs	2 à 8 ml dosage total
Chiens	1 à 2 ml par 10 kg du poids corporel.
Chats	1 ml par 10 kg du poids corporel.

ESPASMOSEDAL

Q-0209-029

VOIE D'ADMINISTRATION:

Intramusculaire profonde ou intraveineuse lente.



AVERTISSEMENTS

Ne pas administrer en combinaison avec des médicaments qui produisent hépato toxicité.
À des doses élevées il peut produire agranulocytose et leucopénie.
Ne pas administrer en combinaison avec de chlorpromazine car ça peut provoquer hypothermie sévère.
Ne pas administrer avec de fenilbutazone ou d'agents barbituriques.
Ne pas administrer chez des animaux sensibles aux ingrédients de la formule.
À conserver à température ambiante, ne dépassant pas le 30°C et dans un endroit sec.
Médicament à garder hors de la portée des enfants.
Destiné à usage exclusif du médecin vétérinaire.
Sa vente requiert prescription médicale quantifiée

TEMPS D'ATTENTE

Ne pas utiliser ce produit 3 jours avant
l'abattage des animaux destinés à la consommation.
Ne pas consommer le lait des animaux traités avant les 3 jours qui suivent à la dernière application du médicament.
Ne pas administrer chez les équidés destinés à la consommation humaine.

PRÉSENTATION

50 ml