

UBRICINA

Q-0209-006



Pommade

Pommade mammaire
Émollient, rubéfiant et anti-inflammatoire



Formule

Chaque dose de 100 g contient :

Salicylate de méthyle	1,5 g
Huile essentielle d'eucalyptus	2 g
Huile de térébenthine	4 mg
Phénol (acide phénique)	3 g
Excipient	100 g

Usage pour



Bovins



Chevaux



Moutons



Chèvres



Chèvres



Cochons

INDICATIONS ET UTILISATIONS

Traitement topique des processus d'inflammation de la glande mammaire comme : mastites, oedèmes post-partum, crevasses du mamelon et tout processus traumatique de la glande mammaire présentant inflammation et douleur chez les bovins, ovins, chèvres et porcins. Utile pour le traitement de foulures, distensions ligamentaires, contusions musculosquelettiques, processus arthritiques, rhumatisants, abcès et tout processus présentant douleur et inflammation.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

PHARMACOCINÉTIQUE : Les principes actifs, étant contenus dans un excipient de pétrolate, ne sont pas absorbés dans le corps ; ils agissent uniquement au niveau de la peau et atteignent les couches intermédiaires où se trouvent les terminaisons nerveuses, produisant un effet analgésique et anti-inflammatoire.

PHARMACODYNAMIQUE : L'acide phénique agit au niveau des terminaisons nerveuses qui se trouvent dans les couches de la peau, produisant un effet analgésique. Le salicylate de méthyle, l'huile d'eucalyptus et l'huile de térébenthine provoquent un effet rubéfiant qui augmente l'irrigation dans la zone d'application, produisant un effet anti-inflammatoire et un effet de chaleur bénéfique.

POSOLOGIE

Appliquer abondamment le produit directement sur la zone d'inflammation ou sur la blessure ; masser en effectuant des mouvements circulaires pendant quelques minutes pour permettre la pénétration du médicament. Répéter le traitement toutes les 12 ou 24 heures selon le cas jusqu'à guérison de la plaie et selon avis du docteur vétérinaire.

VOIE D'ADMINISTRATION: TOPIQUE.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les salicylates peuvent annuler l'action de la vitamine K.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer directement sur plaie ouverte.

Conserver le produit dans un endroit frais, sec et protégé de la lumière. 200 g

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Produit à usage vétérinaire uniquement.

Vendu sur prescription médicale..

PRÉSENTATION