

VERMICELL TABLETAS

Q-0209-019



Comprimés

Anthelminthique.



Formule

Chaque comprimé contient:

| | |
|------------------|------------|
| Mebendazol | 100 mg |
| Excipient q.s.p. | 1 comprimé |

Usage pour



Canines



Félins



Oiseaux

INDICATIONS ET UTILISATIONS

Anthelminthique à large spectre pour chiens, chats et oiseaux de ferme et de combat.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

PHARMACOCINÉTIQUE : Il est administré par voie orale, très peu absorbé dans le tractus intestinal et il atteint un niveau plasmatique inférieur à 1% de la dose administrée. Ce qui est absorbé subit une biotransformation hépatique (décarboxylation) et est excrété dans les selles après 24 à 48 heures. La quantité absorbée est récupérée dans l'urine après 24 à 48 heures.

PHARMACODYNAMIQUE : Le mébendazole inhibe l'assimilation du glucose, ce qui entraîne l'épuisement des réserves de glycogène du parasite, empêchant celui-ci de produire de l'ATP. Il interfère aussi avec la fonction microtubulaire du parasite en se liant à la tubuline ou aux protéines associées à celle-ci, de façon à produire un effondrement de la fonction cellulaire.

AGENTS ÉTIOLOGIQUES

Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia pisciformis*, *Taenia taeniaeformis*, *Echinococcus granulosus*.

Nématodes : *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Capillaria aerophila*, *Capillaria plica*, *Capillaria feliscati*, *Capillaria linearis*, *Capillaria hepatica*, *Aelurostrongylus abstrusus*.

POSOLOGIE

Chiens et chats

Comprimé par jour pour 5 kg de poids corporel, pendant trois jours consécutifs. Oiseaux d'engraissement, de combat et d'ornement 50 à 60 mg par kg de poids corporel, ce qui équivaut à un comprimé par oiseau adulte (2 kg) directement dans le bec en une seule dose.

es

VOIE D'ADMINISTRATION: ORAL

PRÉSENTATION 100 COMPRIMÉS.

PRÉCAUTIONS

Ne pas administrer aux animaux sensibles aux ingrédients de la formule.
Ne pas administrer aux animaux qui présentent des troubles hépatiques.
Ne pas administrer aux animaux faibles ou en convalescence.
Conservé à température ambiante, à moins de 30°C dans un endroit sec.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Produit à usage vétérinaire uniquement.
Vendu sur prescription médicale. Consulter le vétérinaire.

PÉRIODE DE RETRAIT

Ne pas consommer la viande des oiseaux traités dans les 72 heures après le dernier traitement.
Ne pas administrer aux oiseaux de ponte.