

# FIBROCINE

Q-0209-053



## Solution injectable

Fibrolytique



### Composition

Chaque 100 ml contient	
Thiosinamine	7 g
Iodure de sodium	7 g
Salicylate de sodium	7 g
Excipient	100 ml

### Usage pour



Bovine



les chevaux



Moutons



Chèvres



les cochons



Chiens

### INDICATIONS D'UTILISATION

Médicament spécifique afin de favoriser l'absorption du tissu fibreux pathogénique en cas d'inflammation chronique, fibrose ovarienne, fibrose du col de l'utérus, mastite fibreuse, phimosis du prépuce et toutes les blessures chirurgicales et traumatiques des tissus qui produisent fibrine en excès pour être réparés.

### PHARMACOLOGIE CLINIQUE

#### • PHARMACOCINÉTIQUE:

Elle se résorbe rapidement sur l'endroit de l'application et passe par la circulation sanguine liée à l'albumine plasmatique, ayant une bonne distribution dans tous les tissus mous et, en majeure quantité, dans ceux qui présentent une augmentation de l'irrigation sanguine ou de fortes quantités de fibrine. Elle souffre d'un métabolisme hépatique par conjugaison et s'élimine par excrétion rénale.

#### • PHARMACODYNAMIQUE :

L'action fibrinolytique de FIBROCINE provoque l'hydrolyse du collagène et favorise l'absorption de tissu fibreux excessif.

### POSOLOGIE

Animal	Dosis
Bovins et chevaux	10 ml per animal.
Porcs, ovins y caprins	5 ml par animal.
Chiens	1 à 2 ml par animal.

Renouveler la dose à 4 jours d'intervalle jusqu'à ce que le tissu affecté redevienne normale et un maximum de 6 applications au critère du Médecin Vétérinaire.

# FIBROCINE

Q-0209-053

## VOIE D'ADMINISTRATION :

INTRAMUSCULAIRE



## AVERTISSEMENTS :

Ne pas administrer en combinaison avec des médicaments qui produisent hépato toxicité.

Chez des animaux avec d'affections hépatiques de l'intoxication a été observé, allant de vomissements et ataxie jusqu'au collapse cardiorespiratoire.

Le traitement d'urgence est symptomatique : administration de solutions intraveineuses isotoniques, administration de protecteurs hépatiques tel que la carnitine ; administrer de l'oxygène et une alimentation assistée si nécessaire.

Ne pas utiliser chez les chats.

Ne pas administrer chez des animaux sensibles aux ingrédients de la formule.

À conserver à température ambiante, ne dépassant pas le 30°C et dans un endroit sec.

Médicament à garder hors de la portée des enfants.

Destiné à usage exclusif du médecin vétérinaire.

Sa vente requiert une prescription médicale.

Ne pas administrer chez les équidés destinés à la consommation humaine

## TEMPS D'ATTENTE

Ne pas utiliser ce produit 15 jours avant l'abattage des animaux destinés à la consommation.

## PRÉSENTATIONS

50 et 100 ml.