

ANDOMAX FORTE 10%

REGISTRO: Q-0209-002



Solución inyectable

Antibacteriano de amplio espectro.



Fórmula

Cada mL contiene:

Enrofloxacin

100 mg Vehículo c.b.p. 1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa directamente en el núcleo de la bacteria, inhibiendo la acción de la topoisomerasa tipo II o girasa, sobre el ácido desoxirribonucleico (ADN) interfiriendo con los procesos fisiológicos del ADN, así como en su reparación y recombinación, con la cual la célula bacteriana muere. Además este producto es altamente biodisponible por vía parenteral, con una alta penetración tisular y lenta eliminación elevando su eficacia clínica y logrando una amplia distribución a pulmón y otros tejidos. Sus concentraciones terapéuticas altas en el organismo permiten conservar su acción bactericida por 24 horas.

INDICACIONES DE USO Y ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA:

ANDOMAX FORTE 10% solución inyectable es un antibacteriano de amplio espectro y rápida acción bactericida, que combate enfermedades causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y micoplasmas en bovinos productores de carne, leche. Indicado para enfermedades en:

Aparato digestivo: *Salmonella spp.* y *E. coli*.

Infecciones de la piel por: *Fusobacterium spp.* y *Proteus spp.*.

Aparato respiratorio por: *Bordetella spp.*, *Pasteurella spp.* y *micoplasmosis*.

Aparato genitourinario por: *E. coli*, *Streptococcus spp.* y *Corynebacterium spp.*

DOSIS:

Bovinos 1 a 2 mL/40 Kg de peso (equivalente a 2.5-5 mg/kg P.V.) cada 24 horas durante 3 a 5 días consecutivos, a criterio del médico veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Adminístrese por vía parenteral (subcutánea, intramuscular o endovenosa lenta).

TIEMPO DE RETIRO:

Suspender la medicación 5 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano. No consumir productos derivados comestibles sino hasta 5 días después del último tratamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar seco, a no más de 30°C y protegido de la luz solar. No dejar al alcance de los niños.

ANDOMAX FORTE 10%

REGISTRO: Q-0209-002



ADVERTENCIAS:

No se administre conjuntamente con iones bivalentes, pues causa quelación. La combinación con aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación y penicilinas puede causar resistencia en algunos microorganismos, principalmente *Pseudomonas spp.*. No administrar en animales sensibles a los ingredientes de la fórmula. La enrofloxacin es estimulante del SNC y deberá usarse con precaución en pacientes con trastornos convulsivos. Su venta requiere receta médica. Producto de uso veterinario. Consulte al Médico veterinario.

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.