

# ANDOFLOX® 5%

REGISTRO: Q-0209-087



## Solución Oral

Antibacteriano de amplio espectro.



### Fórmula

Cada mL contiene	
Enrofloxacin	50 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

### Uso en especies



Aves de engorda, combate y ornato.

### INDICACIONES Y USOS:

En aves de engorda, de combate y de ornato, andoflox® 5% está indicado para prevenir y tratar: Infecciones del aparato digestivo causadas por *E. coli* y *Salmonella spp.* Infecciones del aparato respiratorio causadas por *Haemophilus spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Pasteurella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Pseudomonas spp.*, y *E. coli*. Infecciones del aparato genital causadas por *Salmonella spp.*, *E. coli*, y *Mycoplasma spp.* Infecciones septicémicas causadas por *E. coli*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, y *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

### FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Andoflox® 5% es un quimioterapéutico de amplio espectro, de acción bactericida porque inhibe la girasa del ADN (topoisomerasa II) y evita la duplicación bacteriana; la respiración y la división celular se detienen, se interrumpen procesos celulares y se altera la integridad de la membrana. Por este mecanismo de acción no se presenta resistencia cruzada con agentes antibacterianos de otra clase. andoflox® 5% solución oral tiene excelente absorción, difusión y biodisponibilidad, alcanzando concentraciones en órganos y fluidos similares a las obtenidas por vía parenteral, ya que su formulación es muy estable en diferentes tipos de dureza de agua, temperaturas de 0 a 50 °C y pH de 0 a 14. La formulación de andoflox® 5% permite alcanzar altos niveles plasmáticos y tisulares con concentraciones terapéuticas hasta por 24 horas. Por su espectro y mecanismo de acción, andoflox® 5% no requiere combinarse con otros antibióticos; en caso de combinación, no se produce antagonismo y en la mayoría de los casos conduce a sinergismo.

### DOSIS:

1 mL/L de agua de bebida (5 mg/Kg) cada 24 horas durante 3 a 5 días.  
En caso de micoplasmosis mantener el tratamiento 5 días consecutivos.  
En caso de salmonelosis mantener el tratamiento 10 días consecutivos.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar seco, a no más de 30 °C y protegido de la luz solar. No dejar al alcance de los niños.

# ANDOFLOX® 5%

REGISTRO: Q-0209-087



## TIEMPO DE RETIRO:

No deberá usarse este producto 2 días antes del sacrificio de las aves destinadas al consumo humano.



## ADVERTENCIAS:

No administrar en aves productoras de huevo para plato. No se administre conjuntamente con iones bivalentes, pues causa quelación. La combinación con aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación y penicilinas puede causar resistencia en algunos microorganismos, principalmente *Pseudomonas spp.* La ciclosporina aumenta el efecto nefrotóxico de la enrofloxacin. No administrar en animales sensibles a los ingredientes de la fórmula. La enrofloxacin es estimulante del SNC y deberá usarse con precaución en pacientes con trastornos convulsivos. Consulte al Médico Veterinario. Producto de uso veterinario. Su venta requiere receta médica

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral, en el agua de bebida.

**Para uso exclusivo del Médico Veterinario**