

CANVITAL®

REGISTRO: Q-0209-001



Polvo oral

Coadyuvante en el tratamiento de dermatitis.



FÓRMULA

Cada 100 g contienen:

Metilsulfonilmetano	10.000 g
Vitamina D2	344,000 IU
Maleato de clorfeniramina	0.090 g
Prednisolona	0.020 g
Vitamina A	140,000 IU
Vitamina B1	0.400 g
Excipiente c.b.p.	100 g

Uso en especies



Caninos



Felinos

INDICACIONES DE USO Y ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA

canvital * se recomienda como coadyuvante en el tratamiento de dermatitis de tipo alérgico: alopecia, eczema y prurito cutáneos. Uso en caninos y felinos.

DOSIS:

Menos de 10 Kg: 5 g (1 cucharadita).

10–20 Kg: 10 g (2 cucharaditas).

Más de 20 Kg: 15 g (3 cucharaditas).

La dosis inicial debe repetirse cada 24 horas y mantenerse por dos semanas o según la respuesta clínica; posteriormente, la dosis debe disminuirse gradualmente a intervalos semanales y suspenderse cuando sea segura la remisión clínica, según el caso y a criterio del médico veterinario.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Oral, mezclado con el alimento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

ADVERTENCIAS:

La administración de corticoides con AINEs aumenta el riesgo de daño gastrointestinal. El uso prolongado y sin supervisión adecuada puede provocar alteraciones endocrinas como enfermedad de Cushing. Uso exclusivo en caninos y felinos. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. Consulte al Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica.

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.