

# ESPASMOSEDAL®

REGISTRO: Q-0209-029



## Solución inyectable.

Analgésico, antiespasmódico, antipirético y desinflamatorio.



### FÓRMULA

Cada 100 mL contienen:

Dipirona sódica	25 g
Sulfato de magnesio	20 g
Alcohol bencílico	2 mL
Excipiente c.b.p.	100 mL

### Uso en especies



Bovinos



Equinos



Ovinos



Caprinos



Caninos



Porcinos



Felinos

### MECANISMO DE ACCIÓN

La acción de la dipirona se basa en la inhibición de la ciclooxigenasa, enzima que convierte el ácido araquidónico en endoperóxidos cíclicos. Su acción antiespasmódica sobre la musculatura lisa regula los centros vegetativos, acompañada de dilatación de vasos periféricos, mejorando la irrigación sanguínea de los músculos estriados. Derivado del pirazol, tiene acción antipirética por vasodilatación cutánea y sudoración. Posee débil acción analgésica sobre estructuras viscerales y muy fuerte sobre estructuras somáticas.

### INDICACIONES DE USO Y ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA:

Analgésico, antiespasmódico, antipirético y desinflamatorio indicado en el control del dolor y tratamiento de: espasmos musculares, cólico en equinos, estados febriles altos, espasmos de musculatura lisa durante el parto. En pequeñas especies previene el vómito; en gastritis evita que las cerdas devoren a sus lechones. Indicado en bovinos productores de carne y leche, equinos no destinados al consumo humano, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.

### DOSIS:

Animal	Dosis
Bovinos	10 mL/100 kg.
Equinos (no destinados al consumo humano)	14 mL/100 kg.
Ovinos y Caprinos	1 mL/10 kg.
Porcinos	2-8 mL total.
Caninos	1-2 mL/10 kg.
Felinos	1 mL/10 kg.

La dosis puede repetirse cada 12 horas según el caso y criterio del Médico Veterinario.

# ESPASMOSEDAL®

REGISTRO: Q-0209-029



**VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular profunda o intravenosa lenta.

### **TIEMPO DE RETIRO:**

No usar este producto 3 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano. La leche de animales tratados no deberá usarse para consumo humano o derivados hasta 3 días después de la última aplicación.

No administrar a equinos destinados al consumo humano.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a no más de 30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños.

### **ADVERTENCIAS:**

No administrar junto con medicamentos hepatotóxicos.  
En altas dosis puede producir agranulocitosis y leucopenia.  
No administrar junto con clorpromazina puede provocar hipotermia severa.  
No administrar con fenilbutazona o barbitúricos.  
Para uso exclusivo del Médico Veterinario.  
Producto de uso veterinario.  
Consulte al Médico Veterinario.  
Su venta requiere receta médica cuantificada.

**Para uso exclusivo del Médico Veterinario.**