

FIBROCINE®

REGISTRO: Q-0209-053



Solución inyectable

Fibrolítico.



FÓRMULA

Cada 100 mL contienen:

Tiosinamina	7 g
Yoduro de sodio	7 g
Salicilato de sodio	7 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Uso en especies



Bovinos



Equinos



Ovinos



Caprinos



Caninos



Porcinos

INDICACIONES DE USO Y ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA

Medicamento específico para promover la absorción de tejido fibroso patogénico, inflamaciones crónicas, fibrosis ovárica, fibrosis del cérvix, mastitis fibrosa y fimosis del prepucio en bovinos productores de carne y leche, ovinos, caprinos y caninos.

DOSIS:

Animal	Dosis
Bovinos y equinos	10 mL.
Porcinos, ovinos y caprinos	5 mL.
Caninos	1-2 mL.

Repetir la dosis cada 4 días hasta lograr la normalidad del tejido afectado, máximo 6 aplicaciones, según criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular

TIEMPO DE RETIRO:

No usar este producto 15 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano. No administrar a equinos destinados al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños.

FIBROCINE®

REGISTRO: Q-0209-053



ADVERTENCIAS:

No utilizar en felinos. No administrar a equinos destinados para consumo humano. Consulte al Médico Veterinario. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. Su venta requiere receta médica.

Para uso exclusivo del Médico Veterinario.